

# A Salomé se la llevó la tos ferina

**A su caso se suma el de otros 9 menores de seis meses. Sus padres crearon una página Web para alertar a otros. La vacuna de los adultos prevendría el contagio a los bebés.**

• POR: MÓNICA TORO  
• FOTOS: JUAN MANUEL VARGAS Y ARCHIVO PARTICULAR



## Parecía una gripe

Cuando Juana ingresó a la morgue vio que Salomé, de 30 días de nacida, era la única que estaba en ese salón frío de 10 metros cuadrados. Allí se echó a llorar encima de ella al verla envuelta en una cobija blanca sobre una lata gris. Esa fue la última vez que Juana vio a su hija.

Salomé Jaramillo Estrada se fue al primer mes de vida. La pequeña dio positivo a esta enfermedad que desde hace dos años ha encendido las alarmas en Colombia. Según la Secretaría de Salud de Bogotá, Salomé hace parte de la lista de 10 menores de 6 meses que murieron en el 2011 por esta infección respiratoria que se creía erradicada. Pero no. La bacteria *Bordetella pertussis* aún ronda en Colombia.

Los síntomas de Salomé empezaron como los de un resfriado común: tos, mocos y silbido en el pecho. Sin embargo, el pediatra al que acudieron sus padres, Juana y Julián, los ignoró y afirmó que eran los de una gripe normal. Dos días más tarde, a los 23 días de nacida, Salomé fue internada en cuidados intensivos después de que su rostro se enrojeciera tras un episodio de tos. Fue diagnosticada con bronquiolitis, cuadro que cambió drásticamente cinco días después al sumarse una neumonía, anemia e hipertensión pulmonar, lo que llevó a los médicos a sospechar que se trataba de una tos ferina. Era una suposición, ya que los resultados de los exámenes tardan 15 días en conocerse.

El contagio, presente Juana, empezó por la tos que se le manifestó al abuelo de la pequeña, quien estuvo en contacto con Salomé y a quien, días después, le diagnosticaron también esta enfermedad. "Sin embargo, es la voluntad de Dios, no la culpa de mi padre ni la mía, porque yo también resulté con tos ferina", señala Juana.

Pasaban los días en cuidados intensivos y los padres se levantaban con ansias de volver a verla en casa. Salomé, igual, se aferraba a la vida, pero era →

Juana conserva en su oficina varias fotos de su Salomé. Para ella, es su primera hija, así esté en el cielo.



## Prevención

Con la vacuna antitosferínica podría prevenirse esta infección. Sin embargo, en Colombia el Estado no la contempla para los adultos, por lo que ellos deberían pagar entre 65.000 y 85.000 pesos por dosis. "No tenemos la orden de aplicar la vacuna a embarazadas ni a adultos que estarán cerca de los niños. Algunos médicos la estamos promoviendo antes del embarazo o durante el segundo y tercer trimestre de gestación, porque hemos visto el incremento de esta enfermedad. No obstante, eso depende de cada adulto que quiera acatar la sugerencia", señala el ginecobstetra Andrés Daste. Sin embargo, el médico sugiere que incluso el núcleo familiar que estará cerca al bebé se aplique la vacuna, para evitar un contagio. Además, hay que evitar todo contacto con personas que estén con síntomas gripales y, lo más importante, si alguien se encuentra con cualquier tipo de tos, debe permanecer distante de un recién nacido y menor de 6 meses, para evitar cualquier complicación.



5  
10  
15  
20  
25  
30

No dude en ir a urgencias si el recién nacido presenta tos, mocos o cualquier alteración mayor. Con esto puede evitar un problema más grave.

→ como sostenerse de un matorral en medio de un tsunami. La bacteria ya había hecho mella en el pulmón derecho, la sangre y el corazón.

Así que accedieron a intubarla. Pero esa, precisamente, era la decisión que menos esperaban sus padres, ya que esa sería la última opción de vida. Esa noche, el 29 de enero, se despidieron de su hija Salomé con la esperanza, mas no con la seguridad, de darle los buenos días en la mañana siguiente. Pero no. A las 12:20 de la noche les informaron la muerte de la pequeña. Llanto, desgarro, insatisfacción pero, en especial, "mucho fuerza para entender que la muerte de un hijo nunca se olvida, pero siempre se acepta", cuenta Juana.

Tras conocer que la tos ferina es una enfermedad que se puede evitar en recién nacidos, Juana y Julián crearon la página web [www.salomesalvauanida.com](http://www.salomesalvauanida.com) con el fin de alertar y concienciar a los padres de que la vacuna de los adultos evita el contagio de tos ferina a los bebés.


Y hoy, siete meses después de que Salomé se marchó, ambos desean más que nunca que esta enfermedad sea controlada, porque ahora esperan a Salomón y piden a su primogénita que lo proteja y guarde a muchos niños que, seguro, no estarán exentos de esta peligrosa infección.

Salomón llegará el próximo primero de junio, la fecha probable de parto que, además, coincide con la misma de Salomé. La tos ferina no rondará de nuevo su casa, pues Juana y su familia ya se aplicaron la vacuna y buscan que otros padres también lo hagan.

## Sí es tos ferina

Esta infección respiratoria, que se transmite a través de gotas de saliva, tos o estornudo, ataca gravemente a menores de seis meses, en especial a bebés de 2 meses de nacidos, ya que ellos aún no tienen su sistema inmunológico desarrollado y no han recibido la vacuna necesaria para impedir o atacar la bacteria.

Nicolás Ramos, pediatra presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría regional Bogotá, señala que el incremento de casos de tos ferina en Colombia y en el mundo se debe a que las personas mayores de 15 años no se están revacunando, lo que indicaría que



## Síntomas

- Tos
- Vómito
- Fiebre
- Riorrea (moco)
- Hundimiento de costillas
- Color rojizo al toser
- Ruido al toser y respirar
- Lagrimeo

Salomé era tranquila. Le encantaban las caricias de sus padres.

## Consecuencias

- Neumonía
- Hemorragia interna y cerebral
- Otitis media
- Convulsiones
- Apneas
- Problemas cardíacos y pulmonares
- Ausentismo escolar y laboral
- Muerte

están expuestos a cualquier enfermedad contagiosa. En el caso de la tos ferina, la manera de prevenirla es por medio de la vacuna de los adultos, ya que

en los bebés se aplica por primera vez a los dos meses de nacidos. No puede ser antes. "Los adultos que estarán cercanos al recién nacido, en especial la mamá, son quienes protegen al menor de cualquier afección médica, ya que él recibirá la antitosferínica a partir del segundo mes de vida. Previamente el sistema inmune no está capacitado ni maduro para aceptarla", explica el doctor Ramos.

Por lo tanto, en el 2, 4, 6, 18 y 60 mes de nacido el Estado colombiano responde por aplicar la dosis contra esta enfermedad. De usted como padre depende verificar su aplicación. abc